

a *A. Busckii*. Ulteriormente, COQUILLET assim se manifestou a proposito da sua especie:

“This is given by Speiser as a synonym of *phyllostomatis* Perty, but is readily distinguished by the fact that the tibiæ are only pubescent, while in *phyllostomatis*, four brasilian specimens of which are before me, the tibiæ are fringed with comparatively long bristly hairs.”

Embora tal distincção não me pareça ter o valor que lhe é attribuido por COQUILLET, penso que a identidade entre as duas especies só poderá ser estabelecida quando se verificar que o aspecto da aza de *A. Busckii* é identico ao da aza de *A. megastigma*. Emquanto esta duvida não fôr resolvida, deve-se considerar *A. Busckii* distincta de *A. phyllostomatis*.

### ***Aspidoptera megastigma* (SPEIS.)**

Segundo verifiquei, os sexos nesta especie se distinguem facilmente pela posição da extremidade do abdomen, quando o insecto é visto de lado. Na femea o segmento genital fica sempre voltado para traz; no macho esse segmento é conico, ligeiramente comprimido e um tanto curvado para baixo, de modo que a fenda por onde passa o orgão copulador, apesar de situada na extremidade do abdomen, fica sempre voltada para baixo. O orgão copulador acha-se quasi sempre escondido dentro do abdomen. Para tornal-o perfeitamente visivel basta tratar-se o exemplar, durante algum tempo, pelo phenol. Apenas em alguns exemplares as tres pontas aguçadas desse orgão, dirigidas para baixo e para diante, acham-se salientes na fenda do segmento genital.

Desta especie examinei 11 exemplares: 2(1 ♂ e 1 ♀) de um frasco que tem o seguinte rotulo — “Sobre *Noctilio leporinus* (Mart.?), Caceres (Matto-Grosso), Miranda Ribeiro, coll. Comissão Rondon”, e 9 (6 ♂♂ e 3 ♀♀) de outro frasco com o seguinte rotulo — “Sobre *Noctilio albiventer*, Matto-Grosso (Corumbá), Comissão Rondon, coll. Miranda Ribeiro.” Este ultimo frasco contém tambem especimens de *Paradyschiria dubia* e delle retirei a pulga, actualmente montada em balsamo, que descrevi recentemente sob o nome de *Ischnopsyllus noctilionis*(\*)

### ***Aspidoptera minuta* sp. nov.**

Especie caracterisada pela forma do thorax que a torna muito semelhante a uma *Lipoptena*, pelas azas rudimentares de nervuras indistinctas

(\*) COSTA LIMA, Dr. A. da, A new species of bat flea from Matto-Grosso, *Ischnopsyllus noctilionis* *Revista de Sciencias*, IV anno, n. 2, Março-Abril, 1920, p. 56, 2 figs. no texto.

